



FRANCESCA LURAGHI S.R.L.
Via Recchi, 9 22100 Como
C.F. e P.IVA 02482560139
Dir. San. Dott.ssa Luraghi
Odontoiatra e Protesista Dentale

TERAPIA CONSERVATIVA

La conservativa e' quella branca dell'odontoiatria che si occupa di ricostruire gli elementi dentari, distrutti da traumi o da processi cariosi, cercando di "conservare" al massimo le strutture naturali.

Essa si divide in due grandi settori : una conservativa diretta (costituita da otturazioni e ricostruzioni) ed una indiretta (costituita da intarsi). La conservativa diretta si occupa di ricostruire, in una sola seduta, le porzioni di dente andate perdute rimuovendo tutto il tessuto malato e immediatamente, tramite l'utilizzo di resine composite ad alto valore estetico e meccanico, ristabilendo forme, dimensioni, colore e funzioni del dente sottoposto al trattamento. Il danno al dente, per motivi fisico-meccanici, deve pero' essere di modesta entita', cioe' non ne deve aver alterato in modo sostanziale la morfologia o non deve essere eccessivamente ampio. La conservativa indiretta invece si occupa di quegli elementi che hanno subito danni maggiori, denti devitalizzati, fratturati) con grosse carie che interessano piu' dei due terzi della superficie masticante. In questi casi una normale ricostruzione non e' piu' sufficiente perche' non garantirebbe una corretta resistenza fisica e meccanica nel tempo. Gli intarsi non sono altro che delle grosse ricostruzioni che vengono realizzate dal tecnico in laboratorio su un modello delle arcate dentarie.

Per la loro esecuzione sono necessari due appuntamenti.

Nel primo si elimina tutto il tessuto malato e/o non adatto ad accogliere il manufatto, si da' una forma corretta alla cavita' che si viene a formare ed infine si prende un' impronta di precisione. A questo punto il tecnico ricostruisce la parte di dente mancante con delle resine composite ad alto valore estetico.

Nel secondo appuntamento si andra' ad incollare l'intarsio che si adattera' perfettamente al dente e questo garantira' stabilita' e durata nel tempo. Particolare menzione deve essere fatta per le sigillature, piccole otturazioni di alto valore preventivo, che vengono realizzate chiudendo, e quindi sigillando, i solchi delle superfici masticanti. Questi recessi sono zone dove spesso hanno inizio le nuove lesioni cariose.

Per queste procedure e' estremamente importante lavorare in ambiente asciutto usando la diga di gomma per permettere la perfetta adesione del materiale allo smalto ed alla dentina del dente. Una imperfetta adesione del materiale e' garanzia per la recidiva cariosa. L' uso del microscopio permette inoltre il controllo della chiusura a 20 ingrandimenti poiche' ad occhio nudo la verifica dell' adesione del manufatto al dente e' totalmente insufficiente.